






Vogelwelt im Revier

Zum Vorkommen ausgewählter
Vogelarten im Lobensteiner Oberland

Gliederung

- Der Arbeitskreis Ornithologie Obere Saale
- Vorkommen und Bestandsentwicklung
 - Ringeltaube
 - Waldschnepfe
 - Stockente
 - Eulen
 - Habichtartige
- Zusammenarbeit mit der Jägerschaft

Der Arbeitskreis Ornithologie Obere Saale



Gliederung

- Der Arbeitskreis Ornithologie Obere Saale
- **Vorkommen und Bestandsentwicklung**
 - Ringeltaube
 - Waldschnepfe
 - Stockente
 - Eulen
 - Habichtartige
- Zusammenarbeit mit der Jägerschaft

Ringeltaube

Nr.	Art	2004	2005	2006	2007	Trend/Jahr
7	Ringeltaube	100,0	107,42	116,6	121,92	7,0

Quelle: DDA 2008

Deutschland: 1.700.000–2.900.000 BP (1999) Quelle: Bauer et al. 2002

Trend:



Einflußfaktoren und Entwicklungen


- Nutzung landwirtschaftlicher Flächen
- Abschußzahlen (9,5 Mio./Jahr in Europa)
- Zunehmende Verstädterung
- Tendenz zur Überwinterung

Ringeltaube

Erfassungslücken

- Nur 560 Datensätze in 55 Jahren
- Bisher nur drei dokumentierte Brutnachweise!

Bestand unbekannt,
Schätzungen realisierbar.



Ringeltaube

Veränderungen im Jahresauftreten

Überwinterungen

2003: 1 Ind. Eisbrücke Burgk

Nov 6 (seit 1980)

Dez 1


Jan 0

Feb 13 (seit 1995)

Früheste Beobachtung: 15.2.

431 Beobachtungen > 2 Ind.

von	bis	Σ
3	10	73
11	99	215
100	249	83
250	999	54
1000	2000	5



Ganz überwiegend:
1970er und 1990er Jahre

Waldschnepe

Deutschland: 12.000–24.000 BP (1999)

Quelle: Bauer et al. 2002

Trend: 


Einflußfaktoren und Entwicklungen

- Lebensraumverlust (Kahlschläge, Fichtenmonokulturen)
- Nahrungsverlust (Intensivierung der Landwirtschaft)
- Jagdstrecken oft einzige Informationsquelle
- Abschußzahlen (3-4 Mio./Jahr in Europa)
- Problematik der Frühjahrsjagd


Waldschnepfe

Bestand gänzlich unbekannt!

Beobachtungen 1952-2007 (n=32)



Beobachtungen 2004-2007 (n=8)



Stockente


Deutschland: 210.000–470.000 BP (1999)

Quelle: Bauer et al. 2002

Trend: 

Einflußfaktoren und Entwicklungen


- Abschlußzahlen (4,5 Mio./Jahr in Europa)
- Abnahme durch Kältewinter und Vergiftungen
- Hybridisierungen




Stockente

Bestandsschätzung:
200–250 BP


Brutnachweise 1962-2007 (n=217)



Brutnachweise 2007 (n=65)



Eulen



Beobachtungen 2004-2007

- Waldohreule
- Waldkauz
- Rauhfußkauz
- Sperlingskauz

Sperber

Beobachteraktivität


Offenland und Siedlungen
erhöhen Wahrscheinlichkeit

Erfassungslücken

Beobachtungen 2004-2007

▲ April - Juli

● August - März



Gliederung

- Der Arbeitskreis Ornithologie Obere Saale
- Vorkommen und Bestandsentwicklung
 - Ringeltaube
 - Waldschnepfe
 - Stockente
 - Eulen
 - Habichtartige
- **Zusammenarbeit mit der Jägerschaft**


Zusammenarbeit mit der Jägerschaft

- Gemeinsame Ziele
- Datenaustausch und Schließen von Lücken
- Praktischer Nutzen
 - **Atlas DEutscher BrutvogelARTen**
 - Artenschutz
- **Bitte um Zusammenarbeit**



Beispiel Buntspecht

Datenstand Buntspecht 27.10.2007, n = 762



Quellen

- Bauer, H.-G., P. Berthold, P. Boye, W. Knief, P. Südbeck & K. Witt (2002): Rote Liste der Brutvögel Deutschlands - 3., überarbeitete Fassung, 8.5.2002. Ber. Vogelschutz 39: 13–60.
- Photos, Zeichnungen, Karten: Sven Kästner

